

DRONCIT COMPRIMIDOS

Tenicida
en comprimido oral

Laboratorio

BAYER

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Prazicuantel 50 mg.

Propiedades farmacológicas

Antihelmíntico eficaz contra las teniasis causadas por: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides corti*, *Taenia pisiformis*, *hydatigena*, *Taenia taenaeformis*.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Perros y Gatos: Teniasis.

Contraindicaciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

En raras ocasiones puede producir diarreas y vómitos.

Vía de administración

Oral.

Posología

Perros y Gatos: 1 comp./10 kg p.v.

- En zonas de alto riesgo de infestación: tratamiento a intervalos de 4 a 6 semanas.
- En zonas de relativo riesgo de infestación: tratamiento 2 a 4 veces por año.
- En casos especiales:

Perras y Gatas de cría en prevención de teniasis: tratamiento 8 días antes del parto con la subsiguiente limpieza a fondo de la perrera y la cama.

Cachorros: tratamiento antes de ser vendidos y 14 días después de la venta.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Estuches con 2 y 50 comprimidos.

Reg. N°

0037-ESP