

# BOLFO COLLAR

Insecticida en collar

## Laboratorio

---

BAYER

## Forma farmacéutica

---

Collar (Collar)

## Composición por collar:

---

100 g contienen: Propoxur 9,40 mg.

## Propiedades farmacológicas

---

Control de infestaciones por pulgas y garrapatas.

## Interacciones e incompatibilidades

---

No administrar conjuntamente con otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, ni inhibidores del SNC.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Perros y Gatos:** Parasitosis externas, especialmente pulgas y garrapatas.

## Contraindicaciones

---

**Gatos:** No utilizar en gatos menores de 6 semanas. Animales en tratamiento tópico, con corticoides, en la zona del cuello.

## Efectos secundarios

---

Ocasionalmente, reacciones de hipersensibilidad en la zona de aplicación.

## Vía de administración

---

Colocar el collar alrededor del cuello del animal a tratar.

## **Posología**

---

**Perros y Gatos:** 1 collar/animal.

## **Tiempo de espera**

---

No procede.

## **Presentación**

---

Estuches con: 1 collar para perros grandes; 1 collar para perros pequeños; y 1 collar para gatos.

## **Reg. N°**

---

0216-ESP