

ERES INYECTABLE

Mucolítico
en solución inyectable

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Bromhexina (clorhidrato) 2,74 mg.

Propiedades farmacológicas

Características generales: La bromhexina es un mucolítico expectorante.

Características farmacodinámicas: La bromhexina disminuye la viscosidad y provoca la licuefacción de las secreciones del epitelio respiratorio al producir la hidrólisis y disolución de las fibras mucopolisacarídicas ácidas (MPSA). De esta forma, la secreción es eliminada fácilmente. También posee una acción expectorante directa.

Características farmacocinéticas: la bromhexina es bien absorbida tras la administración parenteral. Las concentraciones plasmáticas terapéuticas se obtienen aproximadamente a los 15 minutos en todas las especies tras la administración intramuscular. La semivida plasmática de eliminación es alrededor de 6 horas en la mayoría de los animales. La bromhexina se metaboliza rápidamente dando un metabolito activo que es el ambroxol. La principal vía de excreción es la vía urinaria.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Cerdos, Bovino, Equino, Perros y Gatos: Enfermedades de las vías respiratorias que cursen con un incremento de la producción de moco y/o su viscosidad.

Contraindicaciones

Animales con edema pulmonar.

Efectos secundarios

- No se han descrito.
- La bromhexina tiene un amplio margen de seguridad.

Vía de administración

Intramuscular.

Posología

Cerdos:

De 5 a 25 kg: 1,80 a 3,60 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días.

De 25 a 100 kg: 1,80 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días.

De más de 100 kg: 0,73 a 1,80 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días.

Bovino y Equino:

De 50 a 200 kg: 1,80 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días.

De 200 a 500 kg: 0,73 a 1,80 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días.

Perros y Gatos:

1,80 a 3,60 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días.

- En enfermedades respiratorias de origen bacteriano, administrar junto con antibióticos y/o sulfamidas.
- En caso de bronquitis verminosa, utilizarlo 3 días después del uso de un antihelmíntico.

Tiempo de espera

No precisa.

- No administrar en animales que producen leche para consumo humano.
- No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Viales con 30, 50 y 100 ml.

Reg. N°

0458-ESP