

ALSIR[®] 5%

Antibacteriano y antimicoplásmico en solución inyectable

Laboratorio

ESTEVE VETERINARIA

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Enrofloxacin 50 mg.

Indicaciones y especies de destino

Antibacteriano con acción antimicoplásmica para el tratamiento de enfermedades infecciosas de terneros, cerdos y perros, producidas por las siguientes bacterias gram positivas, gram negativas y micoplasmas sensibles al enrofloxacin.

Bovino: *E. coli*, *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Mycoplasma bovis*.

Porcino: *E. coli*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*.

Perro: *E. coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., estafilococos.

Ternero: Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio y digestivo (pasteurelisis, micoplasmosis, colibacilosis, colisepticemia), así como enfermedades bacterianas secundarias, por ejemplo el complejo Crowding gripal del ternero.

Cerdo: Enfermedades bacterianas del tracto digestivo (diarrea y/o septicemia colibacilar).

Tratamiento y profilaxis del síndrome MMA de las cerdas. Pleuroneumonía debida a *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio producidas por *Pasteurella multocida*.

Perro: Infecciones individuales y mixtas bacterianas de los órganos respiratorios y digestivos, del aparato urinario, de la piel, así como prevención de infecciones en heridas.

Contraindicaciones

En perros:

- No deben tratarse animales con trastornos cartilagosos del crecimiento.
- Excluir del tratamiento los perros menores de 12 meses en razas de tamaño pequeño y mediano y 18 meses en razas grandes o que no hayan finalizado su fase de crecimiento.
- También se excluirán los perros con historial clínico epiléptico y con alteraciones nerviosas relacionadas con el GABA.

Vía de administración

Subcutánea o intramuscular.

Posología

Cerdos:

Dosificación básica: 0,50 ml/10 kg p.v./día (equivalente a 2,50 mg/kg p.v./día), durante 3 días seguidos, por vía IM.

- Síndrome MMA: Tratar durante 1 o 2 días.

Terneros:

Dosificación básica: 0,50 ml/10 kg p.v./día (equivalente a 2,50 mg/kg p.v./día), durante 5 días seguidos, por vía SC.

- Evitar aplicar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.

Perros:

Dosificación básica: 5 mg/kg peso vivo y día o 1 ml de Alsir® 5% por 10 kg peso vivo y día.

Tiempo de espera

Carne: 7 días.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 5 frascos de 50 ml; y frasco con 250 ml.

Reg. N°

0903-ESP