

ESPES

Antibacteriano en suspensión inyectable

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por ml:

Bencilpenicilina (procaína) 200000 UI; dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg; vehículo suspensionante, estabilizante y agentes conservantes c.s.p.

Propiedades farmacológicas

Características generales:

- Bencilpenicilina procaína: Antibiótico betalactámico que se engloba dentro de las penicilinas naturales del grupo G, de administración exclusivamente parenteral y espectro reducido.
- Dihidroestreptomicina: Antibiótico aminoglucósido bactericida.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos y otros aminoglucósidos; pentobarbital y anestésicos inhalatorios; relajantes neuromusculares; diuréticos; heparina; gluconato cálcico; riboflavina; triamcinolona; indometacina; fenilbutazona; salicilatos y otros ácidos débiles.

Indicaciones y especies de destino

Cerdos: Artritis, aborto (por *Brucellas*, *Leptospiras* y otros gérmenes sensibles), leptospirosis, mal rojo, neumonía, bronconeumonía y síndrome MMA.

Ovino y Bovino: Abscesos cutáneos, actinomicosis, afecciones podales, artritis, carbunco bacteridiano, leptospirosis, mastitis, metritis, neumonía y bronconeumonía.

Équidos: Metritis, neumonía, bronconeumonía, paperas.

Perros y Gatos: Artritis, infecciones genitourinarias, neumonía y traqueobronquitis, peritonitis.

Contraindicaciones

- Animales con hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos. Animales con insuficiencias renales, hepatopatías o cardiopatías o lesiones cocleovestibulares.
- Animales de menos de 1 mes; así como conejos, cobayas y hámsteres.
- Hembras gestantes.

Efectos secundarios

- Reacciones alérgicas o anafilácticas: se dan en animales hipersensibles, y algunas veces son graves, durando generalmente entre 2 y 4 horas. Los perros y bóvidos viejos suelen estar más predispuestos, y sus síntomas son salivación, temblores, vómitos, respiración dificultosa y edema cutáneo en algunas zonas del cuerpo. En casos graves, se suprimirá la administración, y se aplicará epinefrina inmediatamente.
- En lechones y cerdos de engorde, ocasionalmente y en situaciones de estrés, se puede dar fiebre transitoria, vómitos, incoordinación, temblores y apatía.
- Caballos de capa blanca y piel fina: pueden observarse placas cutáneas y cardenales en el punto de aplicación, con edema local y dolor muscular.

Vía de administración

Intramuscular.

Posología

Cerdos, Ovino, Equino y Bovino: 0,30 a 0,60 ml/10 kg p.v./día.

Perros y Gatos: 0,50 a 1 ml/10 kg p.v./día.

- Agitar antes de usar.
- Debe continuarse el tratamiento hasta 1 o 2 días después de la remisión de los síntomas.

Tiempo de espera

Carne: 30 días.

Leche: 3 días.

- No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Viales con 50, 100 y 250 ml.

Reg. N°

0972-ESP