

# EQ-ZONA

## Antiinflamatorio no esteroideo en granulado oral

### Laboratorio

---

CALIER

### Forma farmacéutica

---

Granulado oral (Gran.o.)

### Composición:

---

Fenilbutazona 1 g; excipientes y conservantes c.s.p. 5 g.

### Propiedades farmacológicas

---

*Propiedades farmacológicas:* La fenilbutazona es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) clásico. Está químicamente relacionado con aminopirina y antipirina y poseen un mecanismo de acción común. Produce un bloqueo del sistema enzimático de la ciclo-oxigenasa de manera, probablemente irreversible. Este hecho le confiere carácter antiinflamatorio *in vivo*.

### Interacciones e incompatibilidades

---

Barbitúricos, corticoides y anticoagulantes (potenciación). Prostaglandinas (efecto prostaglandínico).

### Indicaciones y especies de destino

---

**Équidos:** Procesos inflamatorios de los équidos, excepto los que cursan con lesiones de la mucosa intestinal.

Inflamaciones agudas localizadas del aparato locomotor, como artritis, tendinitis, miositis, sinovitis, infosura, etc. Traumatismos en general. Tratamientos posquirúrgicos de todo tipo como suturas de heridas cutáneas, cirugía del aparato locomotor. Cirugía abdominal, etc. (no interfiere en el proceso de cicatrización).

Dolor en general, ya sea causante de cojera o de cualquier otra claudicación funcional.

### Contraindicaciones

---

Lesiones degenerativas de la mucosa intestinal, deshidratación, insuficiencia renal, insuficiencia hepática.

## Efectos secundarios

---

El uso prolongado puede causar lesiones gastrointestinales. Se ha observado edema ocasional de las extremidades.

## Vía de administración

---

Oral.

## Posología

---

- El granulado se debe administrar siempre en équidos mezclado con la ración diaria, bajo la pauta posológica siguiente:  
Día 1: 4,4 mg/kg cada 12 horas.  
Día 2-5: 2,2 mg/kg cada 12 horas.  
Día 6 en adelante: 2,2 mg/kg cada 24 horas.
- Esta posología equivale, para un caballo adulto de un peso aproximado de 500 kg a:  
Día 1: 2 sobres cada 12 horas.  
Día 2-5: 1 sobre cada 12 horas.  
Día 6 en adelante: 1 sobre cada 24 horas.
- Es imprescindible que el caballo disponga siempre de agua o bebida en abundancia.

## Precauciones especiales

---

No usar 7 días antes de las carreras en animales de competición, pues puede dar positivo en el control antidopaje.

## Tiempo de espera

---

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

## Modo de conservación

---

Conservar en lugar fresco y seco.

## Observaciones

---

Con receta veterinaria.

## Presentación

---

Estuches con 16 sobres de 5 g y cajas con 100 sobres de 5 g.

## Reg. N°

---

1.173-ESP