

# ALAMYCIN LA 300

Antibacteriano  
en solución inyectable

## Laboratorio

---

KARIZOO

## Forma farmacéutica

---

Solución inyectable (Sol.i.)

## Composición por ml:

---

Oxitetraciclina (dihidrato) 300 mg; excipiente c.s.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Ovino, Bovino y Porcino:** Control y tratamiento de una amplia gama de infecciones sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, causadas por organismos sensibles a la oxitetraciclina. Pasteurelisis, neumonía, rinitis atrófica, mal rojo, artritis, onfalitis y como terapia de apoyo en mastitis.

## Contraindicaciones

---

Animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

## Vía de administración

---

Intramuscular profunda.

## Posología

---

30 mg/kg p.v. (1 ml/10 kg. p.v.) para una duración de actividad prolongada, de 5-6 días.

*Dosis máxima recomendada en el punto de inoculación:*

**Ovino:** 5 ml

**Bovino:** 15 ml.

**Porcino:** 10 ml.

**Lechones:**

De 1 día: 0,2 ml.

De 7 días: 0,3 ml.

De 14 días: 0,4 ml.

De 21 días: 0,5 ml.

De más de 21 días: 1 ml.

## Tiempo de espera

---

Carne:

- Ovino: 35 días.

- Bovino: 35 días.

- Porcino: 28 días.

Leche:

- Ovino: 9 días.

- Bovino: 7 días.

## Modo de conservación

---

Conservar en sitio fresco (por debajo de  $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ), seco y al abrigo de la luz.

## Observaciones

---

Con prescripción veterinaria.

## Presentación

---

Frasco de 100 ml.

Envase con 12 frascos de 100 ml.

Envase con 12 frascos de 250 ml.

## Reg. N°

---

1.319-ESP