

# COBACTAN<sup>®</sup> 2,5% P/V SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO Antibacteriano

en suspensión inyectable

## Laboratorio

---

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

## Forma farmacéutica

---

Suspensión inyectable (Susp.i.)

## Composición por ml:

---

Cefquinoma, 25 mg.

## Interacciones e incompatibilidades

---

Se sabe que existe sensibilidad cruzada a las cefalosporinas para bacterias sensibles al grupo de las cefalosporinas.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Bovino:** Procesos respiratorios causados por *Pasteurella multocida* y *M. haemolytica*. Dermatitis interdigital, necrosis bulbar infecciosa y necrosis interdigital aguda. Mastitis aguda por *E. coli* con sintomatología sistémica.

**Terneros:** Septicemia por *E. coli*.

**Cerdos:** Infecciones bacterianas pulmonares y del tracto respiratorio producidas por *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* y otros microorganismos sensibles a cefquinoma. Síndrome Mastitis-Metritis-Agalaxia (MMA) en el que se encuentren involucrados *E.coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* y otros microorganismos sensibles a cefquinoma.

**Lechones:** Reducción de la mortalidad en casos de meningitis provocada por *Streptococcus suis*. Para el tratamiento de artritis producida por *Streptococcus spp.*, *E. coli* y otros organismos sensibles a cefquinoma; Epidermitis (lesiones medias o moderadas) producidas por *Staphylococcus hyicus*.

## Contraindicaciones

---

- Animales que hayan manifestado hipersensibilidad a los antibióticos betalactámicos.
- No administrar a animales con peso inferior a 1,25 kg.

## Efectos secundarios

---

El uso del preparado puede dar una reacción tisular localizada que desaparece 15 días después de la última administración. La hipersensibilidad a cefalosporinas es poco frecuente.

## Vía de administración

---

Intramuscular.

## Posología

---

### **Bovino:**

- Procesos respiratorios y podales: 1 mg/kg p.v. (2 ml/50 kg p.v.), una vez al día durante 3 o 5 días consecutivos.
- Mastitis aguda por *E. coli* con sintomatología sistémica: 1 mg/kg p.v. (2 ml/50kg p.v.), una vez al día durante 2 días consecutivos.

### **Terneros:**

Septicemia: 2 mg/kg p.v. (2 ml/50 kg p.v.) una vez al día durante 3 o 5 días consecutivos.

### **Cerdos:**

- Procesos respiratorios: 2 mg/kg p.v. (2 ml/25 kg p.v.) una vez al día durante 3 días seguidos.
- MMA: 2 mg cefquinoma/kg p.v. (2 ml/25 kg p.v.) una vez al día durante 2 días consecutivos.

### **Lechones:**

- Meningitis, artritis, epidermitis: 2 mg cefquinoma/kg p.v. (2 ml/25 kg p.v.) una vez al día durante 5 días consecutivos.

## Precauciones especiales

---

- Agitar antes de usar.
- Usar jeringuillas y agujas estériles y secas.
- No manejar el producto si sabe que es alérgico a los betalactámicos o si se le ha advertido que no trabaje con este tipo de preparados.
- Manejar el preparado con cuidado para evitar exponerse a él.
- Si aparecen síntomas, tras la exposición al producto, como erupción cutánea, pida consejo médico y muéstrele esta información. Los síntomas más graves como la aparición de hinchazón de la cara, labios u ojos o la dificultad respiratoria, precisan una atención médica urgente.

## Tiempo de espera

---

### Carne:

- Bovino: 5 días.
- Cerdo: 3 días

### Leche:

- Bovino: 1 día.
- Cerdo: no aplica.

## **Modo de conservación**

---

Manténgase a temperatura inferior a 25 °C, y al abrigo de la luz.

## **Observaciones**

---

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

## **Presentación**

---

Frascos de 50 y 100 ml.

## **Reg. N°**

---

1222 ESP