

FICHA TECNICA PARA VADEMECUM

Documento informativo para navegación por internet
No válido para propósitos jurídicos

DENOMINACION DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CANIDRYL 20 mg COMPRIMIDOS PARA PERROS

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN PRINCIPIOS ACTIVOS

Sustancia activa

Carprofeno 20,0 mg/comprimido

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido

Comprimido redondo, plano, de borde biselado, blanco, con una ranura para su fragmentación en una de sus caras. Los comprimidos pueden ser divididos en dos partes iguales.

DATOS CLÍNICOS

Especies de destino

Perros.

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Reducción de la inflamación y el dolor causados por trastornos musculoesqueléticos y enfermedad articular degenerativa. Como continuación de la analgesia parenteral en el control del dolor postquirúrgico.

Contraindicaciones

No utilizar en gatos.

No utilizar en cachorros de menos de 4 meses de edad.

No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No utilizar en perros con cardiopatías, hepatopatías o nefropatías, cuando haya una posibilidad de úlcera o hemorragia gastrointestinales o cuando haya signos de discrasia sanguínea.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Se han informado efectos secundarios típicos asociados con los AINEs, tales como vómitos, heces blandas o diarrea, sangre oculta en heces, pérdida de apetito y letargo. Estas reacciones adversas ocurren generalmente en la primera semana de tratamiento; en la mayoría de casos son transitorias y desaparecen después de terminar el tratamiento, aunque en casos muy raros pueden ser graves o mortales.

En caso de que ocurran reacciones adversas, se suspenderá el uso del medicamento y se acudirá a un veterinario.

Como sucede con otros AINEs, existe el riesgo poco común de efectos adversos renales o hepáticos idiosincrásicos.

Uso durante la gestación o la lactancia

Los estudios efectuados en especies de laboratorio (rata y conejo) han demostrado los efectos fetotóxicos de carprofeno en dosis próximas a la dosis terapéutica. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. No utilizar en perras preñadas o que amamantan.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No debe administrarse carprofeno junto con glucocorticoides.

Posología y vía de administración

Para administración oral.

4 mg de carprofeno por kg de peso vivo y día.

Se administra una dosis inicial de 4 mg de carprofeno por kg de peso vivo y día en forma de dosis única diaria o dividida en dos tomas iguales. La dosis diaria puede reducirse en función de la respuesta clínica.

La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El tratamiento a largo plazo precisa supervisión veterinaria periódica.

Para ampliar la cobertura analgésica y antiinflamatoria postquirúrgica, el tratamiento prequirúrgico parenteral con carprofeno inyectable puede proseguir con comprimidos de carprofeno a 4 mg/kg/día durante 5 días.

No debe superarse la dosis indicada.

DATOS FARMACÉUTICOS

Período de validez

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado en blísteres: 4 años.

Los comprimidos fraccionados o no utilizados deben desecharse inmediatamente.

Precauciones especiales de conservación

Conservar en lugar seco en su embalaje original. Proteger de la luz .

Presentaciones comerciales

Formatos: **Blísteres**

Formato: 140 comprimidos: Caja de 10 blísteres con 14 comprimidos por blister.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1743 ESP