

# FICHA TECNICA PARA VADEMECUM

Documento informativo para navegación por internet  
No válido para propósitos jurídicos

## DENOMINACION DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CANIDRYL 100 mg COMPRIMIDOS PARA PERROS

## COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN PRINCIPIOS ACTIVOS

### Sustancia activa

Carprofeno 100,0 mg/comprimido

## FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido

Comprimido redondo, plano, de borde biselado, blanco a blanquecino, con una ranura para su fragmentación en una de sus caras. Los comprimidos pueden ser divididos en dos partes iguales.

## DATOS CLÍNICOS

### Especies de destino

Perros.

### Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Reducción de la inflamación y el dolor causados por trastornos musculoesqueléticos y enfermedad articular degenerativa. Como continuación de la analgesia parenteral en el control del dolor postquirúrgico.

### Contraindicaciones

No utilizar en gatos.

No utilizar en cachorros de menos de 4 meses de edad.

No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No utilizar en perros con cardiopatías, hepatopatías o nefropatías, cuando haya una posibilidad de úlcera o hemorragia gastrointestinales o cuando haya signos de discrasia sanguínea.

### Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Se han informado efectos secundarios típicos asociados con los AINEs, tales como vómitos, heces blandas o diarrea, sangre oculta en heces, pérdida de apetito y letargo. Estas reacciones adversas ocurren generalmente en la primera semana de tratamiento; en la mayoría de casos son transitorias y desaparecen después de terminar el tratamiento, aunque en casos muy raros pueden ser graves o mortales.

En caso de que ocurran reacciones adversas, se suspenderá el uso del medicamento y se acudirá a un veterinario.

Como sucede con otros AINEs, existe el riesgo poco común de efectos adversos renales o hepáticos idiosincrásicos.

#### **Uso durante la gestación o la lactancia**

Los estudios efectuados en especies de laboratorio (rata y conejo) han demostrado los efectos fetotóxicos de carprofeno en dosis próximas a la dosis terapéutica. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. No utilizar en perras preñadas o que amamantan.

#### **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No debe administrarse carprofeno junto con glucocorticoides.

#### **Posología y vía de administración**

Para administración oral.

4 mg de carprofeno por kg de peso vivo y día.

Se administra una dosis inicial de 4 mg de carprofeno por kg de peso vivo y día en forma de dosis única diaria o dividida en dos tomas iguales. La dosis diaria puede reducirse en función de la respuesta clínica.

La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El tratamiento a largo plazo precisa supervisión veterinaria periódica.

Para ampliar la cobertura analgésica y antiinflamatoria postquirúrgica, el tratamiento prequirúrgico parenteral con carprofeno inyectable puede proseguir con comprimidos de carprofeno a 4 mg/kg/día durante 5 días.

No debe superarse la dosis indicada.

### **DATOS FARMACÉUTICOS**

#### **Período de validez**

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años.

Los comprimidos fraccionados o no utilizados deben desecharse inmediatamente.

#### **Precauciones especiales de conservación**

Conservar en lugar seco en el embalaje original. Proteger de la luz.

#### **Presentaciones comerciales**

Formatos: **Blisteres**

Formato: 140 comprimidos: Caja de 10 blisteres con 14 comprimidos por blister.

### **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1745 ESP