

BANACEP[®] vet 5 mg comprimido recubierto con película para perros y gatos

**Inhibidor de la enzima convertora de la angiotensina
(ECA)
en comprimido oral**

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Benazepril 4,6 mg (equivalente a 5 mg hidrocloreuro de benazepril); dióxido de titanio (E171) 1,929 mg; óxido de hierro amarillo (E172) 0,117 mg; óxido de hierro rojo (E172) 0,014 mg; óxido de hierro negro (E172) 0,004 mg.

Interacciones e incompatibilidades

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros de más de 5 kg de peso.

Gatos: Tratamiento de la insuficiencia renal crónica en gatos.

Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina o cualquier otro ingrediente.
- No usar en perros con insuficiencia cardiaca como resultado de una estenosis aórtica.
- Estudios de laboratorio en ratas han demostrado la embriotoxicidad de benazepril a dosis no materno tóxicas (malformaciones en el sistema urinario del feto).
- La seguridad de este producto no ha sido estudiada en hembras en gestación o en periodo de lactancia.
- No usar en hembras gestantes o en periodo de lactancia.
- No usar en aquellos perros que se empleen como reproductores.

Vía de administración

Oral.

Posología

Perros:

La dosis es de 0,23 mg benazeprilo/kg p.v. y día, que corresponde a 0,25 mg de hidrocloreuro de benazepril/kg p.v. y día. Se debe administrar por vía oral una vez al día, en las comidas o fuera de ellas. Esta dosis corresponde a 1 comprimido por 20 kg, según la tabla siguiente:

Peso del perro (kg)	Número de comprimidos
> 5 - 10	1/2 comprimido
> 10 - 20	1 comprimido

Si se considera clínicamente necesario y es aconsejado por un veterinario, se puede doblar la dosis (manteniendo una única toma).

Gatos:

La dosis es de 0,46 mg benazepril /kg p.v. y día, que corresponde a 0,50 mg de hidrocloreuro de benazepril / kg p.v. y día. Se debe administrar por vía oral una vez al día, en las comidas o fuera de ellas. Esta dosis corresponde a 1 comprimido por 10 kg, según la tabla siguiente:

Peso del gato (kg)	Número de comprimidos
2,5 - 5	1/2 comprimido
5 - 10	1 comprimido

Si se considera clínicamente necesario y es aconsejado por un veterinario, se puede doblar la dosis (manteniendo una única toma).

Precauciones especiales

No se han observado evidencias de toxicidad renal en perros o gatos. Sin embargo, como se utiliza para la insuficiencia renal crónica, se recomienda monitorizar las concentraciones plasmáticas de urea y creatinina durante la terapia.

La seguridad del benazepril no ha quedado demostrada en gatos con un peso inferior a 2,5 Kg

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

No conservar a temperatura superior a 25 °C. Conservar en lugar seco.

Observaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Con receta veterinaria.

Presentación

Caja con 1 blíster (14 comprimidos).
Caja con 10 blísteres (140 comprimidos).

Reg. N°

1845 ESP