

ARPÓN®

Ectoparasitocida en líquido emulsionable

Laboratorio

ZOTAL

Forma farmacéutica

Solución tópica (Sol.t.)

Composición por 100 ml:

Cipermetrina 10%; disolventes y excipientes c.s.p. 100%.

Propiedades farmacológicas

La cipermetrina es un Ectoparasitocida de contacto del grupo de los piretroides tipo II, que se caracteriza por contener un grupo alfa-ciano en su molécula.

Los piretroides tipo II afectan principalmente a los canales de Na en la membrana nerviosa, y causan la prolongación de larga duración del incremento transitorio en la permeabilidad del Na de la membrana durante la excitación. Mantienen la modificación de los canales de Na de forma persistente, despolarizan la membrana y bloquean el potencial de acción sin causar actividad repetitiva presináptica.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Bóvidos y Équidos (cuya carne no se destine al consumo humano): Moscas (*Haematobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea irritans*).

Bóvidos: Piojos (*Linognathus* spp., *Haematopinus* spp.).

Contraindicaciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Tópica.

Posología

Bóvidos y Équidos:

- Control de moscas: Pulverizar al inicio de la estación de las moscas y repetir cada mes. En caso de una excesiva abundancia de moscas de los cuernos y moscas de la cara, pulverizar cada 15 días.
- Control de piojos: Rociar todo el cuerpo del animal cuando se observen los piojos. Repetir tantas veces como sea necesario, con un intervalo mínimo de 14 días.

Para el control de moscas y piojos administrar la solución de 0,1 g de cipermetrina/100 ml de agua (0,1%) (equivalente a 1 ml de Arpón®/100 ml de agua), aplicando:

Bóvidos y Équidos adultos: 500 ml.

Bóvidos jóvenes: 250 ml.

Terneros y Potros: 125 ml.

Precauciones especiales

- Las personas que manipulan el producto deben llevar ropas de protección, guantes y botas de goma. Cuando se administre el producto en forma de pulverización utilizar gorro y mascarilla. Evitar el contacto con piel y ojos. Si esto ocurriera lavar inmediatamente con agua.
- No comer, beber ni fumar durante su manipulación. Lavar las manos y piel expuestas al producto después del trabajo y antes de comer.
- Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
- En caso de derrames, absorber el producto con arena o serrín y lavar las superficies contaminadas con una solución detergente.

Tiempo de espera

Bóvidos: 2 días.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Presentaciones de 60 ml, 250 ml, 1 litro y 5 litros.

Envase de plástico coextrusionado multicapa color blanco, cerrado con una cápsula plástica de color amarillo y tapón dosificador.

Reg. N°

601-ESP