

CLAM OXYL L.A.

Antibacteriano en suspensión inyectable

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por ml:

Amoxicilina (trihidrato) 150 mg.

Propiedades farmacológicas

Antibacteriano atóxico, de acción bactericida frente a un amplio espectro de bacterias patógenas Gram (+) y Gram (-). Administrado por vía intramuscular o subcutánea posee una excelente difusión y alcanza elevadas concentraciones en todos los tejidos. La tasa de unión a las proteínas plasmáticas es del 17%, alcanzando elevadas concentraciones y eliminándose en forma activa por la orina y la bilis. La respuesta terapéutica es rápida y no se produce irritación en el sitio de la inyección.

Interacciones e incompatibilidades

Se desaconseja la administración simultánea con antibacterianos bacteriostáticos y sulfamidas.

Indicaciones y especies de destino

Cerdos: Enteritis bacterianas, infecciones respiratorias, neumonía, infecciones genitourinarias, metritis, heridas y pododermatitis.

Ovino y Caprino: Enteritis bacterianas, infecciones respiratorias, neumonía, infecciones genitourinarias, metritis, heridas, pederio y onfalitis.

Bovino: Enteritis bacterianas, infecciones respiratorias, neumonía, infecciones genitourinarias, metritis, heridas, afecciones podales, onfalitis y mastitis.

Perros y Gatos: Enteritis bacterianas, infecciones respiratorias, neumonía, infecciones genitourinarias, metritis, heridas y afecciones podales.

Contraindicaciones

- Animales alérgicos a la penicilina.
- No administrar a conejos, cobayas y hámsteres.

Efectos secundarios

En algún caso, su empleo puede provocar reacción tisular local transitoria.

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.

- Agitar el frasco antes de usar, para conseguir la suspensión del material activo.
- Si el volumen a inyectar supera los 20 ml, inocularlo repartido en dos puntos distintos.
- Después de su administración, es conveniente masajear bien la zona.

Posología

Todas las especies: En general, administrar 1 ml/10 kg p.v. Si es necesario puede repetirse la dosis a las 48 horas.

Tiempo de espera

Carne:

- Bovino: 55 días.
- Porcino: 30 días.
- Ovino: 30 días.
- Caprino: 30 días.

Leche: 72 horas.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco y seco.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Envases de 100 y 250 ml.

Reg. N°

8.814