

# CORTAVANCE 0,584 mg/ml

Dermoesteroide  
en spray

## Laboratorio

---

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

## Forma farmacéutica

---

Solución para pulverización (Pulv.)

## Composición por ml:

---

Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/ml.

## Propiedades farmacológicas

---

La hidrocortisona aceponato (HCA) en administración tópica se acumula y se metaboliza en la piel. Esto indica que llegan al flujo sanguíneo unas cantidades mínimas. Esta particularidad aumentará el ratio entre el efecto antiinflamatorio local deseado en la piel y los efectos sistémicos indeseables.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Perros:** Tratamiento sintomático de dermatosis inflamatorias y pruríticas.

## Contraindicaciones

---

No usar en úlceras cutáneas.

## Efectos secundarios

---

Ninguno conocido.

## Vía de administración

---

Uso tópico.

## Posología

---

- Aplicar pulsando el pulverizador a una distancia de unos 10 cm de la zona tratada.
- La dosis recomendada es de 1,52 µg de hidrocortisona aceponato/cm<sup>2</sup> de piel afectada al día. Esta dosis puede obtenerse con dos pulsaciones del pulverizador sobre la superficie a tratar equivalente a un cuadrado de 10 cm x 10 cm. Repetir el tratamiento diariamente durante 7 días consecutivos.
- No requiere masaje.

## Precauciones especiales

---

- En el caso de enfermedad microbiana concurrente o de infestación parasitaria, el perro deberá recibir el tratamiento apropiado.
- Como los glucocorticosteroides son conocidos por ralentizar el crecimiento, el uso en animales jóvenes (menores de 7 meses de edad) debe basarse en la evaluación del riesgo-beneficio y se deberán someter a evaluaciones clínicas regulares.
- La superficie corporal total tratada no debe exceder de un área correspondiente, por ejemplo, a un tratamiento de dos costados desde el lomo hasta las cadenas mamarias incluidos los hombros y los muslos.
- No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. Como la absorción sistémica de hidrocortisona aceponato es ínfima, es improbable que las dosis recomendadas produzcan efectos teratogénicos, fetotóxicos y maternotóxicos en perros. Utilizar solamente tras la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

## Modo de conservación

---

No requiere condiciones especiales de conservación.

## Observaciones

---

Con prescripción veterinaria.

## Presentación

---

Frasco con 76 ml.

## Reg. N°

---

EU/2/06/069/001