

ZOOBIOTIC 15% SUSPENSIÓN INYECTABLE

Antibacteriano
en suspensión inyectable

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por ml:

Amoxicilina (trihidrato) 150 mg; vehículo suspensionante, estabilizante y conservante, c.s.

Interacciones e incompatibilidades

- No usar simultáneamente con la neomicina ya que se bloquea la absorción de las penicilinas orales.
- No usar conjuntamente con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana ya que pueden antagonizar la acción bactericida de las penicilinas.

Indicaciones y especies de destino

Bóvidos, Óvidos, Cerdos, Perros y Gatos:

Infecciones causadas por bacterias sensibles como:

- Bacterias Gram (+): Estafilococos no productores de penicilinas (cepas de *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp.), *Streptococcus* (*Streptococcus suis*), Clostridios (*Clostridium perfringens*, *Clostridium tetani*, *Clostridium* spp.), *Arcanobacterium* spp., *Bacillus anthracis*, *Listeria monocytogenes*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

- Bacterias Gram (-): *Pasteurella* spp., *Mannheimia haemolytica*, *Haemophilus* spp., *Actinobacillus* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Moraxella* spp., *Fusobacterium* spp.

Localizadas en tracto digestivo, tracto respiratorio, tracto urogenital, piel y tejidos blandos, así como complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina en enfermedades que lo requieran.

Resistencias:

Las bacterias que generalmente presentan resistencias a la amoxicilina son:

- Los estafilococos productores de penicilinas.
- Alguna enterobacteria como *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*.

Existe resistencia cruzada completa entre la amoxicilina y otras penicilinas, en particular otras aminopenicilinas (ampicilina).

Contraindicaciones

- No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.
- No administrar por vía oral a conejos, cobayas y hámsteres, ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre la población bacteriana cecal.
- No administrar a équidos ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre la población bacteriana cecal.

Efectos secundarios

- Reacciones de sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico.
- Reacción local en el punto de aplicación.
- Sintomatología gastrointestinal (vómitos, diarrea) principalmente en herbívoros.
- Suprainfecciones por gérmenes no sensibles tras su uso prolongado.
- Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis.

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.

Posología

- Todas las especies:** 0,33-0,66 ml de Zoobiotic 15%. Suspensión Inyectable/10 kg p.v.
- Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5 a 7 días. Si no se aprecia mejoría en las primeras 48 horas, reconsiderar el diagnóstico.
 - Agitar el envase antes de su utilización.

Tiempo de espera

Carne:

- Bovino: 55 días.

- Ovino y Porcino: 30 días.

Leche: 48 horas.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Viales con 50 y 100 ml.

Reg. N°

0396-ESP