

TOLFEDINE 60 M G

Antiinflamatorio no esteroideo, analgésico y
antipirético
en comprimido oral

Laboratorio

VÉTOQUINOL E.V.S.A.

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Ácido tolfenámico 60 mg.

Propiedades farmacológicas

El ácido tolfenámico [ácido N-(2-metil-3-clorofenil) antranílico] pertenece al grupo de los fenamatos. Los componentes de este grupo ejercen efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Los fenamatos se clasifican como antiinflamatorios no esteroides (AINEs). La actividad antiinflamatoria del ácido tolfenámico se debe, fundamentalmente, a la inhibición de la ciclooxigenasa, y la consecuente reducción de la síntesis de prostaglandinas, mediadores básicos de la inflamación.

Farmacocinética:

Absorción: En los perros, el ácido tolfenámico se absorbe con facilidad. Tras la administración oral de una dosis de 4 mg/kg, se obtiene una concentración máxima en el plasma de unos 4 µg/ml, al cabo de una hora.

Administrado a esta misma dosis con la comida, la concentración máxima alcanzada es de 2 o 3 µg/ml. Estas variaciones podrían ser debidas al aumento del ciclo entero-hepático cuando se administra junto con el alimento.

Distribución, metabolismo, excreción: el ácido tolfenámico se biotransforma en diferentes metabolitos de reducida actividad.

Interacciones e incompatibilidades

Evitar la administración simultánea y en las 24 horas siguientes a su aplicación de otros antiinflamatorios no esteroides, así como de fármacos potencialmente nefrotóxicos.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento de las crisis agudas de los procesos inflamatorios crónicos que afecten al aparato locomotor.

Contraindicaciones

- Enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.
- Animales que presenten ulceración o hemorragia del tracto gastrointestinal o si existen antecedentes de discrasia hemática o hipersensibilidad al producto.
- Animales menores de 6 semanas de edad; así como animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.
- No utilizar tras la anestesia hasta que el animal esté totalmente recuperado de la misma.

Efectos secundarios

Tolfedine 60 mg posee excelente tolerancia como AINE de primera elección. De forma esporádica pueden aparecer vómitos y diarreas durante el tratamiento, así como poliuria y polidipsia de forma transitoria que cesan al suspender el tratamiento.

Vía de administración

Oral.

Posología

- 1 comp./15 kg/día, junto con el alimento, durante 3 días.
- El tratamiento puede prolongarse, según criterio del facultativo.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 16 comprimidos.

Reg. N^o

0794 ESP