

# TORBUGESIC® INYECTABLE

Analgésico-narcótico  
en solución inyectable

## Laboratorio

---

PFIZER, S.A.

## Forma farmacéutica

---

Solución inyectable (Sol.i.)

## Composición por ml:

---

Butorfanol (tartrato) 10 mg.

## Propiedades farmacológicas

---

*Características generales:* Narcótico sintético, analgésico narcótico totalmente sintético agonista-antagonista del sistema nervioso central, con una potente acción antitusiva. Pertenece al grupo de los fenantrenos.

*Características farmacocinéticas:* Se elimina de la sangre en un plazo de 3 a 4 horas. El fármaco se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina.

## Interacciones e incompatibilidades

---

- No administrar conjuntamente con otros fármacos sedantes o analgésicos ya que pueden producirse efectos de adición.
- Existe interacción entre el butorfanol y la detomidina que supone una modificación de la respuesta terapéutica, que requiere, en el caso de que se utilice, una significativa reducción a 1/4 de la dosis de ambos compuestos.
- Debido a las propiedades antitusivas del butorfanol, no debe ser utilizado en combinación con un expectorante, ya que puede causar una acumulación de moco en las vías respiratorias.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Equino:** Analgesia y cólicos.

- Analgésico para el alivio del dolor abdominal asociado con cólico digestivo.

## Contraindicaciones

---

- No utilizar en potros menores de 1 mes.
- No administrar a caballos con alteraciones renales y/o hepáticas.

## Efectos secundarios

---

Ligera ataxia de poca duración. Otros efectos secundarios observados incluyen: depresión del sistema cardiorrespiratorio y ocasionalmente, estados de excitación.

## Vía de administración

---

Intravenosa.

## Posología

---

**Equino:** 1 ml/100 kg p.v.

## Precauciones especiales

---

- En caso de autoinyección, acudir inmediatamente al médico. La ingestión o la inyección del producto puede causar sedación y otros efectos sobre el sistema nervioso central.
- En caso de exposición a través de la piel u ojos, lavar el área afectada durante 15 minutos.

## Tiempo de espera

---

0 días.

## Modo de conservación

---

- Conservar por debajo de 25 °C.
- Administración exclusiva por el veterinario.

## Observaciones

---

Con prescripción veterinaria.

## Presentación

---

Frasco con 10 ml.  
Frasco con 50 ml.

## Reg. N°

---

1.132-ESP