

STABOX PREMIX

Antibacteriano

en forma de premezcla medicamentosa

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

Forma farmacéutica

Polvo premezcla medicamentosa oral (Prem.p.o.)

Composición por g:

Amoxicilina (trihidrato) 50 mg estabilizada.

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es una penicilina semisintética susceptible a la acción de la penicilinasas.

Características farmacodinámicas: Antibacteriano bactericida que actúa impidiendo la síntesis de la pared bacteriana, de amplio espectro, activo frente a *Streptococcus suis* tipos I y II.

Características farmacocinéticas: En el lechón, la biodisponibilidad tras administración *per os* es del 47%, alcanzándose el máximo sérico en 1,5-2 horas. Se distribuye bien y con rapidez por todo el organismo. Su metabolización es escasa, eliminándose principalmente por orina y, en menor proporción por leche y bilis.

Interacciones e incompatibilidades

No usar simultáneamente con la neomicina ni con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana.

Indicaciones y especies de destino

Lechones: Control de infecciones estreptocócicas después del destete. Reducción de la mortalidad y morbilidad debidas a *Streptococcus suis*.

Contraindicaciones

- No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.
- No administrar por vía oral a conejos, cobayas y hámsteres ni a animales con el rumen funcional.
- No administrar a équidos.

Efectos secundarios

- Reacciones de sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico.
- Suprainfecciones por gérmenes no sensibles tras su uso prolongado.
- Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis.

Vía de administración

Oral, mezclado con el pienso.

Posología

Lechones:

Pre-starter: 400 ppm (8 kg/t).

Starter: 300 ppm (6 kg/t).

- La duración del tratamiento será de dos semanas.
- La premezcla permanece estable en el pienso durante 6 meses.
- Las condiciones de temperatura, presión y humedad a las que puede someterse la premezcla para granulación son las habituales (temperatura de hasta 80 °C, 16% de humedad, 10 bares de presión).

Precauciones especiales

Evitar el contacto directo con el producto por existir riesgo de reacciones alérgicas para la persona que lo manipule.

Tiempo de espera

Carne: 3 días.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envases de 25 kg.

Reg. N°

1.166-ESP