

VIRBAM EC SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINOS

Antiparasitario endectocida
en solución inyectable

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Ivermectina 10 mg.

Propiedades farmacológicas

La ivermectina es un derivado de la familia de las avermectinas, agentes antiparasitarios altamente activos, de amplio espectro.

La ivermectina provoca el bloqueo de la transmisión de los impulsos nerviosos, y estimula la liberación del GABA a nivel de las terminaciones nerviosas presinápticas (en nematodos) o a nivel de las uniones neuromusculares (en artrópodos), induciendo la parálisis y muerte de estos parásitos.

Indicaciones y especies de destino

Bóvidos: Para el tratamiento y control de:

- Vermes redondos gastrointestinales (adultos y L4): *Ostertagia* spp. (incluyendo formas inhibidas de *Ostertagia ostertagi*), *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp. (adulto).
- Vermes pulmonares (adultos y L4): *Dictyocaulus viviparus*.
- Barros (estadios parasitarios): *Hypoderma* spp.
- Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*.
- Ácaros: *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*.

Contraindicaciones

- No administrar por vía intramuscular o intravenosa.
- No administrar en caso de hipersensibilidad conocida al principio activo.

Efectos secundarios

- Se ha observado una escasa incidencia de reacciones inflamatorias en el punto de inyección que desaparecen sin tratamiento.
- En casos muy escasos: dolores transitorios. En algunos casos: alteración transitoria del estado general.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

1 ml de Virbamec Solución Inyectable para Bovinos por cada 50 kg de peso vivo, o sea 0,2 mg de ivermectina por kg de peso vivo.

- Una única inyección subcutánea.

Tiempo de espera

Carne: 42 días.

- No administrar a animales productores de leche para el consumo humano.
- No administrar a vacas lecheras que no están en lactación, incluyendo vacas gestantes en los 60 días previos al parto.

Modo de conservación

Conservar en su embalaje de origen y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

50 ml, 200 ml, 500 ml y 1000 ml.

Reg. N°

1.413-ESP