

OTOMAX[®] GOTAS ÓTICAS EN SUSPENSIÓN

Antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio

en gotas óticas en suspensión

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Suspensión ótica (Susp.ót.)

Composición por ml:

Gentamicina (sulfato) 2640 UI, betametasona (valerato) 0,88 mg; clotrimazol 8,80 mg, excipiente oleoso c.s.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar el producto de forma concomitante con otras sustancias de ototoxicidad conocida.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento de otitis externa aguda. También para tratamiento de exacerbación a corto plazo de los signos agudos de la otitis externa crónica, de origen bacteriano y fúngico causadas por bacterias sensibles a gentamicina, tales como *Staphylococcus intermedius*, y hongos sensibles a clotrimazol, en particular *Malassezia pachydermatis*.

Contraindicaciones

- No administrar a perras gestantes o lactantes.
- No administrar a perros con la membrana timpánica perforada.
- No administrar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.
- No administrar el producto de forma concomitante con otras sustancias de ototoxicidad conocida.

Efectos secundarios

- Localmente pueden aparecer pápulas eritematosas; estas lesiones ceden cuando se interrumpe el tratamiento.
- Especialmente en animales de edad, se ha observado un deterioro auditivo temporal y casos extremadamente raros de pérdida auditiva irreversible. En caso de que aparezca disfunción auditiva o vestibular, el tratamiento debe ser interrumpido inmediatamente y el conducto auditivo limpiado cuidadosamente utilizando una solución no ototóxica.
- La utilización prolongada y frecuente de preparaciones corticosteroides induce efectos adversos locales y sistémicos. Éstos incluyen supresión de la función adrenal, adelgazamiento de la piel y retraso en la curación de heridas.

Vía de administración

Ótica.

Posología

Perros que pesen menos de 15 kg: Aplicar 4 gotas al oído dos veces al día.

Perros que pesen más de 15 kg: Aplicar 8 gotas al oído dos veces al día.

- La duración del tratamiento es de 7 días.
- Tras la aplicación, masajear breve y suavemente la base del oído para permitir que la preparación penetre a la parte inferior del canal auditivo.
- Una gota del producto corresponde a 66,9 UI de gentamicina, 22,3 µg de betametasona y 223 µg de clotrimazol.

Precauciones especiales

- Agitar bien el producto antes de la administración.
- Antes de aplicar el producto, se debe examinar minuciosamente el canal auditivo externo para asegurar que la membrana timpánica no está perforada a fin de evitar el riesgo de transmisión de la infección al oído medio y prevenir el daño a los aparatos coclear y vestibular.
- Limpiar y secar meticulosamente el oído externo antes del tratamiento. El exceso de pelo alrededor del área de tratamiento ha de ser eliminado.
- Evitar el contacto con el producto.
- Lavar las manos cuidadosamente tras la aplicación del producto. En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar con grandes cantidades de agua.
- No manejar el producto si tiene hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

No almacenar por encima de 25 °C.

Observaciones

- Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación

Frascos con 14 ml y 34 ml.

Reg. N°

1294 ESP