

ZOOGAM A[®]-D

Antiparasitario externo

en solución tópica para ovinos

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Solución tópica (Sol.t.)

Composición por ml:

Diazinón (estabilizado) 150 mg, excipientes c.s.

Interacciones e incompatibilidades

- No administrar con otros inhibidores de la colinesterasa.
- No suministrar con fármacos depresores del SNC tipo fenotiazinas.

Indicaciones y especies de destino

Ovinos: Control y prevención de la sarna, piojos, pulgas, garrapatas, melófagos y moscas y sus larvas. Consultar prospecto para conocer las especies frente a las que es efectivo.

Contraindicaciones

- No administrar a animales enfermos, convalecientes, débiles, exhaustos o sedientos.
- No suministrar a animales con heridas o lesiones abiertas.
- No tratar a animales de menos de 4 semanas.

Efectos secundarios

Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad cutánea.

Vía de administración

Tópica (baño o pulverización).

Posología

Baño (para infestaciones por ácaros, larvas de moscas, garrapatas, piojos y *Melophagus ovinus*): Preparar el baño con una solución de 250 mg de diazinón/l de agua (equivalente a 20 ml de Zoogama®-D en 12 litros de agua). Para reponer el volumen perdido preparar una solución de 750 mg de diazinón/l de agua (equivalente a 60 ml de Zoogama®-D en 12 litros de agua).

Pulverización (para infestaciones por larvas de mosca, garrapatas, piojos y *Melophagus ovinus*): Pulverizar con una solución de 625 mg de diazinón/l de agua (equivalente a 50 ml de Zoogama®-D en 12 litros de agua).

- Para el tratamiento de sarnas, las ovejas deben sumergirse totalmente en el baño, excepto la cabeza y las orejas, durante no menos de un minuto. La cabeza se sumergirá al menos dos veces, permitiendo respirar al animal entre cada inmersión.
- Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas se recomienda bañar a las ovejas en primavera antes de la paridera. Si la infestación es grave se repetirá el baño 6 semanas después.

Precauciones especiales

- No mezclar con ningún otro baño.
- No bañar a los animales inmediatamente después de comer.
- No bañar ovejas con menos de 2 semanas de crecimiento de lana.
- No bañar a las ovejas cuando el tiempo sea húmedo y tormentoso, si hace frío o calor extremos o cuando la lana se encuentre mojada.
- Mantener la concentración del baño, rellenándolo cuando el volumen haya descendido un 10%.
- El baño debe vaciarse y limpiarse al final del día, con lo que se evita la acumulación de bacterias como *Erysipelothrix rhusiopathiae*.
- Evitar el contacto repetido o prolongado con la piel. No inhalar los vapores.
- Usar guantes, botas de goma, ropa adecuada y mascarilla cuando se maneje el concentrado, el baño y las ovejas recién bañadas o pulverizadas.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente. Lavarse la cara, manos y piel expuestas al abandonar el recinto de trabajo.
- No fumar, comer o beber durante la aplicación del producto. No almacenar junto a bebidas o alimentos.
- Usar el producto en áreas bien ventiladas, preferiblemente al aire libre.
- En caso de padecer problemas respiratorios, o si se ha presentado malestar persistente tras la manipulación de otros organofosforados, consultar con el médico antes de usar el producto. Los síntomas de intoxicación son: sensación de cansancio y debilidad, que puede ir acompañada de dolor abdominal, diarrea, sudoración y salivación excesiva hasta 12 horas después de la exposición. La intoxicación grave causa convulsiones musculares generalizadas.
- El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación. La intoxicación por ingestión muestra los síntomas de una intoxicación colinérgica. Síntomas muscarínicos: Hipersalivación, vómitos, diarrea, miosis y lagrimeo. Síntomas nicotínicos: Temblores y contracciones musculares. En la intoxicación se usa como antídoto atropina, al objeto de bloquear los receptores muscarínicos y un reactivante de la colinesterasa como el 2-PAM.
- El diazinón es tóxico para abejas, peces, aves y otras formas de vida. Destruir de forma segura los envases, restos y material usado en el baño de los animales. No contaminar con ellos las aguas continentales. No eliminar el baño en aguas continentales ni en terrenos fácilmente encharcables.

Tiempo de espera

Carne: 15 días.

Leche: No usar.

- No administrar a hembras en lactación cuya leche se destine al consumo humano.

Modo de conservación

Conservar en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.

Observaciones

- Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
- Administrado sólo por el veterinario o bajo su supervisión.

Presentación

Envases de 250 ml, 1 litro y 5 litros.

Reg. N°

1435 ESP