

NOROCLAV 250 mg / 50 mg

Comprimidos

Antibacteriano en comprimido oral

Laboratorio

KARIZOO

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición:

Noroclav Comprimidos 250 mg contiene 200 mg de amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) y 50 mg de ácido clavulánico (como clavulanato potásico Ph. Eur.). Contiene carmoisina (E122) como excipiente.

Noroclav Comprimidos 50 mg contiene 40 mg de amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) y 10 mg de ácido clavulánico (como clavulanato potásico). Contiene carmoisina (E122) como excipiente.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento de las siguientes infecciones causadas por cepas productoras de β -lactamasas de bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación con el ácido clavulánico:

- Infecciones de la piel (incluyendo piodermas superficiales y profundas) causadas por estafilococos susceptibles.
- Infecciones del tracto urinario causadas por estafilococos o *Escherichia coli* susceptibles.
- Infecciones respiratorias causadas por estafilococos susceptibles. Enteritis causadas por *Escherichia coli* susceptible.

Contraindicaciones

- No usar en conejos, cobayas, hámsteres o jerbos.
- No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas u otras sustancias del grupo betalactámico.
- No usar en animales con disfunción renal severa asociada con anuria u oliguria.
- No usar cuando se sepa que existen resistencias a esta combinación.

Vía de administración

Oral.

Posología

Noroclav 250 mg Comprimidos:

Dosis: 12,5 mg/kg p.v. dos veces al día (equivalente a un comprimido de 250 mg por 20 kg p.v.).

- La mayoría de los casos responden con una terapia de 5 a 7 días.
- Casos crónicos o refractarios: en los casos donde existe un considerable daño tisular, será necesaria una duración mayor que permita un período de tiempo suficiente para reparar el tejido dañado.

Noroclav 50 mg Comprimidos:

Dosis: 12,5 mg/kg p.v. dos veces al día (equivalente a comprimido de 250 mg por 20 kg p.v.).

- La mayoría de los casos responden con una terapia de 5 a 7 días.
- Casos crónicos o refractarios: en los casos donde existe un considerable daño tisular, será necesaria una duración mayor que permita un período de tiempo suficiente para reparar el tejido dañado.

Modo de conservación

Conservar a una temperatura inferior a 25 °C y en el envase original para protegerlo de la humedad.

Presentación

Noroclav 250 mg Comprimidos

Cajas de 4, 10 y 50 blísteres conteniendo 5 comprimidos por blíster.

Noroclav 50 mg Comprimidos

Cajas de 2, 10 y 50 blísteres conteniendo 10 comprimidos por blíster.

Reg. N°

Noroclav 250 mg Comprimidos: 1572 ESP

Noroclav 50 mg Comprimidos: 1571 ESP