

NICILAN 40/10 comprimidos

Antibacteriano

en comprimido oral

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Amoxicilina (trihidrato) 40 mg; ácido clavulánico (clavulanato de potasio) 10 mg; eritrosina (E127) 0,75 mg.

Indicaciones y especies de destino

Perros y Gatos: Nicilan 40/10 comprimidos está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de beta-lactamasas resistentes a amoxicilina.

- Infecciones del tracto respiratorio.
- Infecciones del tracto urogenital.
- Infecciones del tracto digestivo.
- Infecciones de la piel y tejidos blandos.

Contraindicaciones

- No administrar a animales con historial de alergia a los antibióticos betalactámicos.
- No administrar a conejos, cobayas y hámsteres.

Vía de administración

Vía oral.

Posología

La dosis es de 12,5 mg de antibiótico/kg de peso vivo dos veces al día. Lo que equivale a la siguiente tabla de dosificación:

Peso vivo (kg)	Nº de comprimidos dos veces al día
1-2	1/2
3-5	1
6-9	2
10-13	3

Se recomienda administrar el medicamento al principio de las comidas, para minimizar los posibles efectos gastrointestinales.

Los comprimidos se pueden dar mezclados con el alimento.

Duración del tratamiento:

Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5-7 días.

Se puede aumentar la dosis y frecuencia de administración, según criterio veterinario.

Precauciones especiales

- Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.
- Evitar el contacto directo con el producto por existir riesgo de reacciones alérgicas para la persona que lo manipule.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

Observaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Con receta veterinaria.

Presentación

Cajas con 12, 60, 120 y 240 comprimidos.

Reg. N°

1814 ESP