

VETERIN CORION®

Gonadotropina

en solución extemporánea inyectable

Laboratorio

DIVASA-FARMAVIC, S.A. (DFV®)

Forma farmacéutica

Solución extemporánea inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Gonadotropina coriónica humana (HCG) 750 UI; excipiente c.s.p. 1 ml.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Vacas: Tratamiento de quistes ováricos.

Yeguas: Inducción a la ovulación.

Cerdas, Perras y Gatas: Tratamiento de quistes ováricos y de los estados causados por los mismos (ninfomanía o anestro).

Contraindicaciones

No administrar a animales con alteraciones renales y/o cardíacas.

Efectos secundarios

Se han descrito como efectos secundarios la aparición de hiperestimulación ovárica e hipersensibilidad.

Vía de administración

Intramuscular o endovenosa.

Posología

Vacas:

- Tratamiento del quiste ovárico:
 - 5000 UI (equivalente a 6,6 ml de Veterin Corion®) vía IV en dosis única. Si a las 3-4 semanas no se observa la respuesta deseada, puede repetirse la administración.
 - 10000 UI (equivalente a 13,3 ml de Veterin Corion®) vía IM en dosis única.

Yeguas:

- Inducción de la ovulación: 2000-3000 UI (equivalente a 2,6 - 4 ml de Veterin Corion®) vía IV en dosis única, a las 48 horas de iniciado el estro.

Cerdas:

- Tratamiento del quiste ovárico: 500-1000 UI (equivalente a 0,6 - 1,3 ml de Veterin Corion®) vía IM en dosis única.

Perras - Gatas:

- Tratamiento del quiste ovárico: 250-500 UI (equivalente a 0,3 - 0,7 ml de Veterin Corion®) vía IM en dosis única.

Recomendación para una correcta administración:

- En cerdas el tratamiento del quiste ovárico va asociado a la aplicación de la gonadotropina sérica (PM SG) entre 72-98 horas antes del tratamiento con gonadotropina coriónica.
- En yeguas, el tratamiento de quistes ováricos va asociado a la aplicación de prostaglandinas siete días más tarde.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

- Manténgase a temperatura inferior a 25 °C.
- Periodo de validez una vez reconstituido: Uso inmediato.

Observaciones

De uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración exclusiva por el veterinario.

Presentación

Envase con un frasco que contiene 3000 UI de HCG, con el disolvente adecuado para preparar 4 ml de solución.

Reg. N°

2.006 ESP