

TOCO-SELENIO

Vitamina E y selenio
en solución inyectable

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Vitamina E (acetato de α -tocoferol) 80 mg; selenio (selenito sódico) 0,80 mg.

Interacciones e incompatibilidades

El azufre exacerba la carencia marginal de selenio.

Indicaciones y especies de destino

Bóvidos y Óvidos: Enfermedad del músculo blanco.

Cerdos: Enfermedad del corazón de mora, hepatitis dietética.

En general, en enfermedades originadas por deficiencia de vitamina E y selenio.

Contraindicaciones

Animales que ingieran pastos, forrajes o concentrados con elevado contenido en selenio.

Efectos secundarios

Puede aparecer irritación y dolor en el punto de inoculación. Se pueden producir raramente reacciones de tipo anafiláctico.

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.

Posología

Bóvidos: 0,03-0,06 mg Se + 3-6 mg vitamina E/kg p.v. (equivalente a 3,75-7,5 ml de toco-selenio/100 kg p.v.). Repetir la dosis al cabo de 2-4 semanas en caso de ser necesario.

Óvidos: (para prevenir la deficiencia de vitamina E y selenio en corderos) 0,06 mg Se + 6 mg vitamina E/kg p.v. (equivalente a 1,5 ml de toco-selenio/20 kg p.v.), después del tercer mes de gestación.

Cerdos: Cerdas (para prevenir la deficiencia de vitamina E y selenio en los lechones): 0,06 mg Se + 6 mg vitamina E/kg p.v. (equivalente a 7,5 ml de toco-selenio/100 kg p.v.).

Tiempo de espera

Carne:

- Bóvidos: 34 días.

- Óvidos y Cerdos: 16 días.

Leche: No administrar a animales que producen leche destinada al consumo humano.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Viales con 50 y 100 ml.

Reg. N°

8.549