

SPASM OBRONCHAL[®] GRANULADO

Broncodilatador
en granulado oral

Laboratorio

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Forma farmacéutica

Granulado oral (Gran.o.)

Composición por g:

Clenbuterol hidrocloreuro 16 µg.

Propiedades farmacológicas

Características generales: Agente simpaticomimético β -2.

Características farmacodinámicas: Provoca dilatación de los bronquios. Posee también una considerable influencia sobre los mecanismos de limpieza bronquial; la mucosidad viscosa se fluidifica y elimina rápidamente. La dificultad respiratoria y la frecuencia e intensidad de la tos ceden a los pocos días de la administración regular del preparado.

Características farmacocinéticas: Su efecto se presenta rápidamente y se mantiene durante 6-8 horas.

Interacciones e incompatibilidades

- No administrar junto con simpaticomiméticos, corticoesteroides e inhibidores de la fosfodiesterasa.
- La administración simultánea con anestésicos del tipo halotano y ciclopropano puede llevar a la aparición de alteraciones del ritmo cardíaco.
- Posible reducción del efecto de sustancias activas sobre el útero, como oxitocina, prostaglandinas y alcaloides del cornezuelo del centeno.
- Antagonizado por bloqueantes β -adrenérgicos.

Indicaciones y especies de destino

Equino: Bronconeumonía, huélfago y neumonía.

- Coadyuvante del tratamiento de los procesos respiratorios que cursen con espasmo de la musculatura bronquial, de cualquier origen. Tos y disnea como consecuencia de espasmos bronquiales.
- En combinación con antibióticos y/o sulfamidas, y con broncosecretolíticos.

Contraindicaciones

- En animales gestantes debería suspenderse el tratamiento 1-2 días antes de la fecha prevista del parto puesto que sus propiedades inhibitoras de las contracciones uterinas pueden influir sobre el transcurso del mismo.
- Dado que Spasmobronchal se elimina con la leche, no alimentar a recién nacidos con leche procedente de madres tratadas con Spasmobronchal®.

Efectos secundarios

Aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial y de la frecuencia respiratoria.

Vía de administración

Oral.

Posología

Equino: 0,50 g/10 kg p.v., 2 veces al día, durante 10 días.

Precauciones especiales

Spasmobronchal® es un simpaticomimético y debe, al igual que todos los simpaticomiméticos, considerarse como un producto de dopaje.

Tiempo de espera

No permitido su uso en équidos cuya carne se destine para el consumo humano.

Modo de conservación

No precisa condiciones especiales de conservación.

Observaciones

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 500 g.

Reg. N°

9.368