

| | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------|---------------|
|  | DOCUMENTO TÉCNICO | | Doc: | FT-DIG604 |
| | FICHA TÉCNICA ULYTE 20 ML | | Revisión/Fecha: | 02/30.01.2018 |
| | | | | Página 1 de 3 |

Ulyte 20 ml

Alimento complementario dietético con alto contenido en electrolitos e ingredientes muy digestibles

Composición (por litro): Dextrosa 21,25%, Agua 12,47%, Glicerina 10%, Hidrolizado de proteínas vegetales 5,5%, Harina de algarroba 3,4%, Fructooligosacáridos 3%, Carbón vegetal 2%, Cloruro de sodio 0,85%, Sorbitol 0,85%, Cloruro de potasio 0,26%, Cloruro de magnesio 0,17%.

Aditivos: Microorganismos: 4b1705 *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 $5,5 \times 10^{11}$ ufc/l. **Agentes ligantes y antiaglutinantes:** 1m558i Bentonita 290.000 mg/l. **Otros:** Sustancias aromáticas y apetentes, aditivos tecnológicos.

Contenido en: Sodio 2,50%, Potasio 0,50%. Contenido en energía: 13,7 kcal/100 g.

Constituyentes analíticos: Aceites y grasas brutas 0,08%, Proteína bruta 1,74%, Humedad 41%, Cenizas brutas 23,41%, Fibra bruta 0,23%.

Objetivo de nutrición específico: Reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal.

Indicaciones: Soporte nutricional en procesos diarreicos y otras alteraciones digestivas. A utilizar durante periodos de diarrea aguda y su convalecencia.

Contraindicaciones: No está recomendado su utilización en cachorros que no hayan sido destetados.

Especies de destino: Perros y gatos.

Modo de administración: Ulyte 20 ml se administra por vía oral. Retirar la tapa de la punta de la jeringa y girar la rueda hasta seleccionar los ml necesarios para obtener la dosis deseada. Cada división corresponde a 1 ml. Después de seleccionar la dosis presionar el émbolo y aplicar directamente en la boca del animal (por un lateral) depositando la pasta en la parte posterior de la lengua para facilitar la ingestión.

Posología: Se debe administrar la dosis indicada en la tabla adjunta 2 veces al día.

| | | | | |
|-------|--------|------------|------------|--------|
| Peso | <10 kg | 11 – 25 kg | 26 – 40 kg | >40 kg |
| Dosis | 2 ml | 4 ml | 6 ml | 8 ml |

Su uso puede prolongarse hasta 1 – 2 semanas, aunque habitualmente son suficientes dos días de tratamiento. En caso de diarreas severas, la dosis puede duplicarse, siempre a criterio veterinario. Se recomienda consultar siempre al veterinario antes de su utilización.

Presentación: Caja con 1 jeringa de 20 ml.

Modo de conservación: Mantener el envase siempre cerrado y en lugar fresco y seco. Una vez abierto, consumir en un plazo de 3 meses. Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE

USO VETERINARIO

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|
|  | DOCUMENTO TÉCNICO | Doc: FT-DIG604 |
| | FICHA TÉCNICA ULYTE 20 ML | Revisión/Fecha: 02/30.01.2018 |
| | | Página 2 de 2 |

Comercializado por:

URANO VET, S.L.
Avenida Santa Eulàlia, 2.
08520 Les Franqueses del Vallès | Barcelona | España
Tel asistencia técnica: 900 809 965
info@uranovet.com | www.uranovet.com
Nº Registro establecimiento: ESP08600759

Fabricado por:

SYNERGIE PROD
11 Rue de Beauséjour | ZI Actipole 249
49450 Saint Andre de la Marche | Francia
Nº Registro establecimiento: αFR49264006