

TROCOXIL

Antinflamatorio no esteroideo
en comprimido masticable oral

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Comprimido masticable (Comp.m.)

Composición por comprimido:

Mavacoxib 6 mg (Trocoxil 6 mg comprimidos masticables para perros).
Mavacoxib 20 mg (Trocoxil 20 mg comprimidos masticables para perros).
Mavacoxib 30 mg (Trocoxil 30 mg comprimidos masticables para perros).
Mavacoxib 75 mg (Trocoxil 75 mg comprimidos masticables para perros).
Mavacoxib 95 mg (Trocoxil 95 mg comprimidos masticables para perros).

Propiedades farmacológicas

Mavacoxib es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de tipo coxib. Es la 4-[5-(4-fluorofenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-benzenosulfonamida. Se trata de un pirazol diarilsustituido. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la cyclooxygenasa (COX). Mavacoxib actúa mediante inhibición preferente de la síntesis de prostaglandinas mediadas por COX-2. Posee por tanto propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Los productos del metabolismo de COX-2 también están involucrados en la ovulación, la implantación, y el cierre del ductus arteriosus. Tanto COX-1 como COX-2 se encuentran en el riñón y se cree que tienen acción protectora frente a circunstancias fisiológicas adversas.

Mavacoxib tiene buena absorción tras la administración oral; la biodisponibilidad fue del 87% en perros alimentados y 46% en condiciones de ayuno y la dosis recomendada se basa en su administración con alimentos.

Mavacoxib se une aproximadamente en un 98% a proteínas plasmáticas.

Interacciones e incompatibilidades

- No se han realizado estudios de interacción con otros medicamentos. Al igual que con otros AINES, no se deberá emplear Trocoxil junto a otros AINES o glucocorticoides.
- En caso de que se administre Trocoxil junto a un anticoagulante los perros deberán ser controlados cuidadosamente.
- Los AINES tienen gran afinidad por las proteínas plasmáticas y pueden competir con otras sustancias que también la posean, por lo que su administración concomitante puede dar lugar a efectos nocivos. Si debiera administrarse otro AINE después del tratamiento con Trocoxil, debe asegurarse un periodo de al menos UN MES sin tratamiento para evitar la aparición de reacciones adversas.

Indicaciones y especies de destino

Perros de 12 o más meses: Para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a enfermedad articular degenerativa en perros, en aquellos casos en los que este indicado un tratamiento continuo que exceda de un mes.

Contraindicaciones

- No emplear en perros menores de 12 meses y/o con menos de 5 kg de peso.
- No emplear en perros con úlcera gastrointestinal o sangrado.
- No emplear en alteraciones hemorrágicas.
- No emplear cuando las funciones renal o hepática estén alteradas.
- No emplear en casos de insuficiencia cardíaca.
- No emplear en caso de gestación o lactancia.
- No emplear en caso de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes.
- No emplear en caso de hipersensibilidad a sulfonamidas.
- No emplear junto con glucocorticoides u otros AINES.

Efectos secundarios

- A veces se han registrado reacciones adversas a AINES, tales como pérdida de apetito, diarrea, vómitos, apatía, y alteración de parámetros bioquímicos renales y disfunción renal. En raras ocasiones pueden resultar letales.
- Si apareciera una reacción adversa a mavacoxib, se interrumpirá su administración y se aplicará el tratamiento general de apoyo propio de las sobredosificaciones clínicas con AINES.

Vía de administración

Vía oral.

Posología

- No es un AINE para administración diaria.
- La dosis es de 2 mg de Mavacoxib por kg de peso, administrados inmediatamente antes o junto con la comida del perro. Se deberá asegurar que el comprimido es ingerido. El tratamiento se repetirá a los 14 días y posteriormente el intervalo de dosificación será de un mes. Un ciclo de tratamiento no deberá sobrepasar 7 dosis consecutivas (6,5 meses).

Precauciones especiales

- Los animales deberán someterse a un examen clínico exhaustivo antes de comenzar el tratamiento con Trocoxil. Los animales con evidencia de disfunción hepática o renal, o con evidencia de enteropatía con pérdida de sangre o proteínas, no son adecuados para el tratamiento con Trocoxil. Se recomienda repetir el examen clínico un mes después de haber empezado el tratamiento con Trocoxil y antes de la administración de la tercera dosis.
- No utilizar en animales gestantes, reproductores o lactantes.
- En caso de autoadministración accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o el texto del envase.
- No coma, beba o fume mientras manipule el producto. Lávese las manos después de manipular el producto.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

No requiere condiciones especiales de conservación. Conservar en le embalaje original.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Caja con blíster de 2 comprimidos de 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg o 95 mg de mavacoxib.

Reg. N°

EU/2/08/084/001 (Trocoxil 6 mg comprimidos masticables para perros)
EU/2/08/084/002 (Trocoxil 20 mg comprimidos masticables para perros)
EU/2/08/084/003 (Trocoxil 30 mg comprimidos masticables para perros)
EU/2/08/084/004 (Trocoxil 75 mg comprimidos masticables para perros)
EU/2/08/084/005 (Trocoxil 95 mg comprimidos masticables para perros)