

# **STRONGHOLD 60 mg Solución para unción dorsal puntual**

**Antiparasitario  
en solución para unción dorsal puntual**

## **Laboratorio**

---

PFIZER, S.A.

## **Forma farmacéutica**

---

Solución para unción dorsal puntual (Sol. u. d. p.)

## **Composición por pipeta:**

---

0,5 ml (60 mg de selamectina).

## **Propiedades farmacológicas**

---

Selamectina es un compuesto semisintético de la clase de las avermectinas. Selamectina paraliza y/o mata a una gran variedad de parásitos invertebrados al interferir en la conductividad del canal del cloro, provocando la interrupción de la neurotransmisión normal. Ello inhibe la actividad eléctrica de las células nerviosas en los nematodos y de las células musculares en los artrópodos produciéndoles parálisis y/o muerte.

Selamectina se absorbe desde la piel tras la administración tópica. Una vez absorbida, selamectina se distribuye sistémicamente y se elimina lentamente del plasma como se manifiesta en las concentraciones plasmáticas detectables en perros y gatos, 30 días después de una sola dosis tópica de 6 mg/kg. La persistencia sistémica de selamectina en el plasma y la ausencia de un rápido metabolismo, proporcionan concentraciones eficaces de selamectina durante el período de intervalo entre dosis (30 días).

## **Interacciones e incompatibilidades**

---

No se han descrito.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Perros que pesen entre 5,1 y 10,0 kg:** Tratamiento y prevención de las infestaciones producidas por pulgas (*Ctenocephalides* spp.). Elimina adultos, huevos y larvas de pulgas. Utilización como parte del tratamiento estratégico de la dermatitis alérgica a pulgas. Puede ayudar en el control de infestaciones de pulgas existentes en el ambiente en áreas en las que el animal tiene acceso. Tratamiento de vermes redondos intestinales adultos (*Toxocara canis*). Prevención de la enfermedad del parásito del corazón (*Dirofilaria immitis*). Tratamiento de piojos masticadores (*Trichodectes canis*). Tratamiento de los ácaros de los oídos (*Otodectes cynotis*). Tratamiento de la sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*).

## Contraindicaciones

---

No utilizar en animales menores de 6 semanas de edad.

## Efectos secundarios

---

Alopecia e irritación local transitoria que suele resolverse espontáneamente.

## Vía de administración

---

Administrar tópicamente en la piel, en la base del cuello delante de los hombros.

## Posología

---

**Perros que pesen entre 5,1 y 10,0 kg:** Contenido de 1 pipeta (60 mg).

## Precauciones especiales

---

No aplicar si el animal tiene el pelo húmedo.

## Tiempo de espera

---

No procede.

## Modo de conservación

---

- No almacenar a temperatura superior a 30 °C.
- Conservar en lugar seco y sin abrir la lámina protectora.

## Observaciones

---

Con receta veterinaria.

## **Presentación**

---

3 pipetas.

## **Reg. N°**

---

EU/2/99/014/004